

2×Taq MasterMix (Dye)

目录号: P34721S (1 ml)

P34721M (5 ml)

P34721L (25 ml)

保存条件: -20℃

产品内容

Component	P34721S	P34721M	P34721L
	1 ml	5 ml	25 ml
2×Taq MasterMix (Dye)	1 ml	5×1 ml	5×5 ml
ddH ₂ O	1 ml	5×1 ml	5×5 ml

注意: 2×Taq MasterMix含有Taq DNA Polymerase, 3 mM MgCl₂ 和400 μM each dNTP。

产品简介

Taq MasterMix是由Taq DNA Polymerase、Mg²⁺、dNTPs以及PCR稳定剂和增强剂组成的预混体系, 浓度为2×。预配好的PCR混合液使操作更加简单快捷, 并可最大限度地减少人为误差和污染。独创的MasterMix配方使扩增产物得率高, 重复性强, 稳定性好。本产品已加入染料(蓝色), 反应结束后可直接进行电泳检测。扩增得到的PCR产物3'端附有一个“A”碱基, 因此可直接用于T/A克隆。主要适用于PCR法扩增DNA、DNA序列测定等实验。

质量控制

经检验无外源核酸酶活性; PCR方法检测无宿主残余DNA; 能有效地扩增多种基因组中的单拷贝基因。

使用方法

以下举例为以人基因组DNA为模板，扩增1 kb的片段的PCR反应体系和反应条件，实际操作中应根据模板、引物结构和目的片段大小不同进行相应的改进和优化。

1. PCR反应体系

试剂	50 μ l反应体系	终浓度
2 \times Taq MasterMix (Dye)	25 μ l	1 \times
Forward Primer, 10 μ M	2 μ l	0.4 μ M
Reverse Primer, 10 μ M	2 μ l	0.4 μ M
Template DNA	<0.5 μ g	<0.5 μ g/50 μ l
ddH ₂ O	up to 50 μ l	

注意：引物浓度请以终浓度0.1-1.0 μ M作为设定范围的参考。扩增效率不高的情况下，可提高引物的浓度；发生非特异性反应时，可降低引物浓度，由此优化反应体系。

2. PCR反应条件

步骤	温度	时间	
预变性	94 $^{\circ}$ C	2 min	} 25-35 个循环
变性	94 $^{\circ}$ C	30 s	
退火	55-65 $^{\circ}$ C	30 s	
延伸	72 $^{\circ}$ C	30 s	
终延伸	72 $^{\circ}$ C	2 min	

注意：

- 1) 一般实验中退火温度比扩增引物的溶解温度 T_m 低5 $^{\circ}$ C，无法得到理想的扩增效率时，适当降低退火温度；发生非特异性反应时，提高退火温度，由此优化反应条件。
- 2) 延伸时间应根据所扩增片段大小设定，本产品Taq DNA Polymerase的扩增效率为2 kb/min。
- 3) 可根据扩增产物的下游应用设定循环数。如果循环次数太少，扩增量不足；如果循环次数太多，错配机会会增加，非特异性背景严重。所以在保证产物得率的前提下应尽量减少循环次数。